

Association Marie-Hélène

L'autisme, comment ça se diagnostique?



Dépistage précoce

18 mois :

Dépistage possible d'enfant « à risque autistique »

vers 3 ans:

Diagnostic d'autisme peut être posé

**Dépistage précoce
+ Interventions précoces
= Meilleure évolution de l'enfant
(plasticité cérébrale...)**



Signaux d'alerte:



0-1 an

- **absence de sourire social** (en réponse au sourire parental)
- **défaut d'attitude anticipatrice** (l'enfant ne tend pas les bras quand son parent s'approche)
- **fuite du regard, une impression de surdit ** (d faut de r action aux sons ou   l'appel du pr nom)
- **d faut de vocalisations**

1-2 ans

- **Absence de jeux de faire semblant, d'attention conjointe** (suivre le regard de l'adulte pour regarder la m me chose) et **de pointage d claratif** (montrer du doigt ce qui int resse)
- **Attitudes contemplatives** (lumiere, objets circulaires)
- **Mouvements r p titifs** (balancements, pianotage des doigts)



On constate 2 modes d'apparition

**Signes visibles dès
les premiers mois**

**Développement
d'allure normale puis
régression ou
stagnation**



La pratique du diagnostic



- Diagnostic clinique
- Par un médecin
- En collaboration avec la famille
- Bilans complémentaires conseillés (génétique, psychologique, etc...)

Mais actuellement...

- ◆ Les enfants sont souvent diagnostiqués « tard »,
- ◆ Beaucoup d'adultes reçoivent seulement maintenant leur diagnostic



Association Marie-Hélène

L'autisme, et ses troubles associés les plus fréquents



Troubles associés :

- ◆ Retard intellectuel 70%
- ◆ Troubles psychiatriques (50-75%): troubles anxieux, dépression...
- ◆ Troubles du sommeil (45-86%)
- ◆ Épilepsie (5-40%)

- ◆ Maladies génétiques (X fragile, Syndrome de Bourneville ...)



L'autisme, c'est :

- ❖ 400 000 à 600 000 personnes en France
- ❖ 67 millions de personnes dans le monde
- ❖ 91 600 à 106 000* enfants de moins de 20 ans
- ❖ 6 000 à 8 000 bébés par an qui naissent en France

*RAPPORT IGAS N° 2016-094R / IGEN N° 2017-031



C'est enfin reconnu !

« Les facteurs psychologiques parentaux, en particuliers maternels, et les modalités d'interactions précoces n'expliquent en aucune façon la survenue des TED »

HAS 2010

